

FASE I:

- Determine inicialmente uma partição básica factível $\mathbf{A}=[\mathbf{B},\mathbf{N}]$. A rigor, precisamos de dois vetores de índices básicos e não-básicos:

$$(B_1, B_2, \dots, B_m) \text{ e } (N_1, N_2, \dots, N_{n-m}).$$

Os vetores das variáveis básicas e não básicas são, respectivamente:

$$\mathbf{x}_B^T = [x_{B_1} \ x_{B_2} \ \dots \ x_{B_m}] \text{ e } \mathbf{x}_N^T = [x_{N_1} \ x_{N_2} \ \dots \ x_{N_{n-m}}]$$

Faça iteração = 1.

FASE II:

{início da iteração simplex}

Passo 1: {cálculo da solução básica}

$$\begin{cases} \hat{\mathbf{x}}_B = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} \text{ (equivalentemente, resolva o sistema } \mathbf{B}\mathbf{x}_B = \mathbf{b}) \\ \hat{\mathbf{x}}_N = \mathbf{0} \end{cases}$$

Passo 2: {cálculo dos custos relativos}

2.1) {vetor multiplicador simplex}

$$\boldsymbol{\pi}^T = \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \text{ (equivalentemente, resolva o sistema } \mathbf{B}^T \boldsymbol{\pi} = \mathbf{c}_B)$$

2.2) {custos relativos}

$$\hat{c}_{N_j} = c_{N_j} - \boldsymbol{\pi}^T \mathbf{a}_{N_j} \quad j = 1, 2, \dots, n - m$$

2.3) {determinação da variável a entrar na base}

$$\hat{c}_{N_k} = \text{mínimo} \{ \hat{c}_{N_j}, j = 1, \dots, n - m \}$$

Passo 3: {teste de otimalidade}

Se $\hat{c}_{N_k} \geq 0$ então: PARE {solução na iteração atual é ótima}.

Passo 4: {direção simplex}

$$\mathbf{y} = \mathbf{B}^{-1} \mathbf{a}_{N_k} \text{ (equivalentemente, resolva o sistema: } \mathbf{B}\mathbf{y} = \mathbf{a}_{N_k} \text{)}$$

Passo 5: {determinação do passo e variável a sair da base}

Se $\mathbf{y} \leq \mathbf{0}$ então: PARE {problema não tem solução ótima finita: $f(\mathbf{x}) \rightarrow -\infty$ }

Caso contrário, determine a variável a sair da base pela razão mínima:

$$\hat{\epsilon} = \frac{\hat{x}_{B_\ell}}{y_\ell} = \text{mínimo} \left\{ \frac{\hat{x}_{B_i}}{y_i} \text{ talque } y_i > 0, i = 1, \dots, m \right\}$$

(a variável x_{B_ℓ} sai da base)

Passo 6: {atualização: nova partição básica, troque a ℓ -ésima coluna de $\mathbf{B}$ pela k -ésima coluna de $\mathbf{N}$ }:

$$\text{matriz básica nova: } \mathbf{B} = [\mathbf{a}_{B_1} \ \dots \ \mathbf{a}_{B_{\ell-1}} \ \mathbf{a}_{N_k} \ \mathbf{a}_{B_{\ell+1}} \ \dots \ \mathbf{a}_{B_m}]$$

$$\text{matriz não básica nova: } \mathbf{N} = [\mathbf{a}_{N_1} \ \dots \ \mathbf{a}_{N_{k-1}} \ \mathbf{a}_{B_\ell} \ \mathbf{a}_{N_{k+1}} \ \dots \ \mathbf{a}_{N_{n-m}}]$$

iteração = iteração + 1

Retorne ao passo 1.

{fim da iteração simplex}