

Cálculo I - Lista 3 (Gabarito)

1a) $D(f) = \{x \in \mathbb{R}; \quad x \geq 2\}$

$$Im(f) = \{y \in \mathbb{R}; \quad y \geq \sqrt{8}\}$$

1b) $D(f) = \{x \in \mathbb{R}; \quad x < -1 \quad \text{ou} \quad x \geq 0\}$

$$Im(f) = \{y \in \mathbb{R}; \quad y \geq 0 \quad \text{e} \quad x \neq 2\}$$

1c) $D(f) = \{x \in \mathbb{R}; \quad -\frac{1}{3} \leq x \leq 2\}$

$$Im(f) = \{y \in \mathbb{R}; \quad 0 \leq y \leq \frac{7}{2\sqrt{3}}\}$$

4d) $D(f) = \{x \in \mathbb{R}; \quad x \geq 1\}$

$$Im(f) = \{y \in \mathbb{R}; \quad 0 \leq y \leq \frac{1}{2\sqrt{3}}\}$$

- 2) Seja $[a, b]$ intervalo fechado domínio da função f . Então, $f(a) \leq f(x) \leq f(b)$ para todo $x \in [a, b]$, ie, f é limitada.

O intervalo precisa ser fechado pois, se $f(x) = \frac{1}{x}$ definida no intervalo aberto $(0, 1)$, não é limitada.

3) $f_1(x) \leq \sup_{x \in A} f_1(x)$ para todo $x \in A$

$$f_2(x) \leq \sup_{x \in A} f_2(x) \text{ para todo } x \in A$$

$$\text{Logo, } f_1(x) + f_2(x) \leq \sup_{x \in A} f_1(x) + \sup_{x \in A} f_2(x) \text{ para todo } x \in A \text{ e, portanto, } \sup_{x \in A} (f_1(x) + f_2(x)) \leq \sup_{x \in A} f_1(x) + \sup_{x \in A} f_2(x)$$

$$f_1(x) \geq \inf_{x \in A} f_1(x) \text{ para todo } x \in A$$

$$f_2(x) \geq \inf_{x \in A} f_2(x) \text{ para todo } x \in A$$

$$\text{Logo, } f_1(x) + f_2(x) \geq \inf_{x \in A} f_1(x) + \inf_{x \in A} f_2(x) \text{ para todo } x \in A \text{ e, portanto, } \inf_{x \in A} (f_1(x) + f_2(x)) \geq \inf_{x \in A} f_1(x) + \inf_{x \in A} f_2(x)$$

- 5a) Contradomínio igual a $\mathbb{R}$: f é par

Contradomínio igual a $\mathbb{R}^+$: f é par e sobrejetora.

- 5b) f é ímpar.

- 5c) $f: (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \tan(x)$ é crescente, ímpar e bijetora.

- 5d) f é limitada e par.

- 5e) f é limitada e par.

- 6 O produto de duas funções pares é uma função par.

O produto de duas funções ímpares é uma função par.

O produto de uma função par por uma função ímpar é uma função ímpar.

- 7) f, g funções pares. $f \circ g(-x) = f(g(-x)) = f(g(x)) = f \circ g(x)$, ie, $f \circ g$ é par.

f, g funções ímpares. $f \circ g(-x) = f(g(-x)) = f(-g(x)) = -f(g(x)) = f \circ g(x)$, ie, $f \circ g$ é ímpar.

f função par e g função ímpar.

$f \circ g(-x) = f(g(-x)) = f(-g(x)) = f(g(x)) = f \circ g(x)$, ie, $f \circ g$ é par.

$g \circ f(-x) = g(f(-x)) = g(f(x)) = g \circ f(x)$, ie, $f \circ g$ é par.

- 8) Se f é estritamente crescente ou estritamente decrescente então f é injetora. Como f é sobrejetora então f é bijetora e, portanto, invertível.

A recíproca é falsa. Considere $f: (0, 2) - \{1\} \rightarrow (0, 2) - \{1\}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \in (0, 1) \\ -x + 3, & x \in (1, 2) \end{cases}$$

- 9) • $\sqrt{x-2}$

 • x

 • $\frac{1}{x-1}$

 • x^2

- 10) $C \cos(x + \phi) = C \cos x \cos \phi - C \sin x \sin \phi = (C \cos \phi) \cos x + (-C \sin \phi) \sin x$

Resolvendo $A = C \cos \phi$ e $B = -C \sin \phi$ obtemos $C = \sqrt{A^2 + B^2}$ e $\phi = \arctan -\frac{B}{A}$